Un ejemplar topotipo de la especie argentina del genero Camptodontus Dej. (Coleopt.)

por ANGEL ZOTTA

Conservador de las Colecciones Entomológicas del Museo Nacional de Historia Natural "B. Rivadavia"

Autorizado por el Sr. Director del Museo Prof. D. M. Doello Jurado realicé en el mes de Julio ppdo. una excursión a la Gobernación del Chaco y Prov. de Corrientes, en compañía del Sr. Alberto Carcelles, encargado de la Sección de Malacología y del Sr. Secundino da Fonseca, ayudante de la Sección Botánica.

Al llegar a Santa Fé fuimos recibidos en la casa del Dr. Frenguelli quien nos atendió con su conocida amabilidad; allí el Sr. Bonazzola, hermano político del Dr. Frenguelli nos proporcionó varias recomendaciones para su campo de Urien (Chaco).

Es en este punto donde hemos conseguido empezar nuestra recolección de material botánico y zoológico; coleccionando para la sección botánica una buena cantidad de muestras de maderas como también especies de las familias Catáceas y Bromeliáceas, las que fueron trasladadas vivas a Buenos Aires para ser cultivadas en el Museo.

Para la colección zoológica se recolectó abundante material consistente en aves, mamíferos e insectos, especialmente de estos últimos pude cazar en la localidad de Itaty (Prov. de Corrientes), un carábido que no existía en la colección del Museo, llamándome la atención por haberlo hallado debajo de las piedras en las aguas del Río Paraná. (1)

Llegado al Museo traté inmediatamente de identificarlo resultando ser un topotipo de la especie *Camptodontus crenatus* de Brullé, que también fué hallado debajo de las piedras a lo largo del Paraná.

Doy a continuación la descripción genérica y específica de esta especie, traducida de la descripción original y una breve lista de los insectos traidos de esta excursión.

Comptodontus Dejean,

Species general des coléopteres, V., p., 477. (1826)

"Mentón articulado plano, tribolado y cuyo diente del medio es más largo que los laterales. Labio superior muy corto y poco distinto. Mandíbulas avanzadas, arqueadas, muy agudas y no dentadas interiormente, último artículo de los palpos labiales casi cilíndricos. Antenas

(1) El Dr. Bruch tiene en su colección ejemplares del Chaco, Santa Fé, Formosa y Misiones. (Nota de la D.)

filiformes; el primer artículo tan largo como los dos siguientes reunidos; los restantes más pequeños, bastantes alargados y engrosados un poco hacia su extremidad. Cuerpo alargado y algo deprimido. Corselete casi cordiforme. Patas anteriores palmadas".

Camptodontus crenatus Brullé

in D' Orbigny, Voyage dans l' Amerique Meridional VI part. 2 pág. 41. (1843)

"Las dos especies de *Camptodontus* conocidas, la una (cayennensis Dej. Spec. II. 477), tiene las estrías de los élitros fuertemente puntuadas como la que nosotros describiremos aquí, pero ofrece sobre el corselete cinco líneas o surcos longitudinales; la otra (clivinoides Lap. Ann. Soc. Ent. Franc. I. 393), tiene las estrías de los élitros completamente lisas. El *Camptodontus crenatus,* muy vecino al de Cayena puede reconocerse por la puntuación de su cabeza, que es muy fina, parecida a ligeras rugosidades sobre la parte anterior, y no ofreciendo sobre el vertex nada más que una banda transversal de puntos bien marcados así como la disposición de las líneas de su corselete; este parece tan largo como ancho, un poco más estrecho hacia adelante que atrás y cortado oblícuamente en los ángulos posteriores, hacia los cuales ofrece un muy pequeño diente; su superficie presenta un surco mediano bien marcado y crenelado hacia atrás, de cada costado del cual se apercibe otro surco sinuoso, ensanchado en su mitad inferior y cuyo fondo es rugoso, hacia afuera de este último surco y sobre la parte anterior del corselete se nota una serie longitudinal de puntos muy poco marcados o pequeñas impresiones transversales. Todos los restantes caracteres de este insecto se acercan al *Camptodontus* de Cayena. Ha sido cazado en la provincia de Corrientes, bajo las piedras a lo largo del Paraná".

Coleoptera

Cicindela apiata Dej.
Galerita collaris Dej.
Brachynus immarginatus Brullé
Scarites cayennensis Germ.
Anisodactylus cupripennis Germ.
Feroniomorpha striatula Fabr.
Megadytes glaucus Brullé
Rhantus signatus Fabr.
Gyrinus argentinus Steinch.
Chalcolepidius limbatus Eschsch.
Ischiodontus unicolor Blanch.
Monocrepidus scalaris Germ.
Pyrophorus punctatissimus Blanch.

Hemiptera

Nezara armigera Stal.
Edessa meditabunda Fabr.
Demoleus oblongus Fabr.
Largus fasciatus Blanch.
Largus rufipennis Lap. de Cast.